

Nuevos productos para conseguir un mayor control de la presión arterial

Almirall lanza Parapres Plus 32® y Parapres Plus Forte® para el tratamiento de la hipertensión arterial

- En España sólo 4 de cada 10 pacientes hipertensos tratados tienen controlada su hipertensión arterial (HTA).
- La HTA es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Su prevalencia es de aproximadamente un 35% en personas mayores de 18 años y alcanza el 68% en los mayores de 60 años.
- El objetivo del tratamiento de la HTA es reducir la morbilidad cardiovascular asociada a la presión arterial elevada. En los pacientes con enfermedad cardiovascular o diabetes se recomienda que esta reducción sea todavía mayor.

Barcelona, 1 de diciembre de 2009.- Almirall, compañía farmacéutica internacional radicada en España, anuncia el lanzamiento de dos extensiones de línea Parapres Plus® (candesartán cilexetilo/hidroclorotiazida). **Parapres Plus 32® y Parapres Plus Forte®** están indicados en pacientes hipertensos cuya presión arterial no esté controlada de forma adecuada con monoterapia¹.

La HTA es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Su prevalencia es de aproximadamente un 35% en personas mayores de 18 años y alcanza el 68% en los mayores de 60 años².

El objetivo del tratamiento de la HTA es reducir la morbilidad cardiovascular asociada a la PA. La recomendación general es el descenso de la PA por debajo de 140/90 mmHg. En el caso de pacientes con enfermedad cardiovascular, diabetes o nefropatía es razonable reducir la PA a cifras inferiores a 130/80 mmHg³.

En este sentido, Parapres Plus 32® y Parapres Plus Forte® consiguen un mayor control de la presión arterial (PA)⁴, que en España solo se encuentra controlada en 4 de cada 10 pacientes hipertensos⁵.

Sobre la hipertensión arterial

La OMS define la HTA como un trastorno cuya patogenia se desconoce en muchos casos, que -en última instancia- causa aumento de la presión diastólica y sistólica, así como alteraciones del lecho vascular y alteraciones funcionales de los tejidos afectados.

La mayoría de los afectados no tienen síntomas. Eso no quiere decir que no sea peligrosa, puesto que gran parte de las muertes que se producen cada año lo son como consecuencia de la hipertensión o de sus complicaciones sobre el sistema cardiovascular o el riñón.

Sobre Parapres Plus 32® y Parapres Plus Forte®

Parapres Plus 32® (Candesartán 32 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg) y Parapres Plus Forte® (Candesartán 32 mg + Hidroclorotiazida 25 mg) son dos especialidades que refuerzan la familia de productos Parapres, utilizada en el tratamiento del paciente hipertenso.

Estas nuevas presentaciones están indicadas para el control de la presión arterial en aquellos pacientes hipertensos que no alcancen el objetivo establecido de forma adecuada con monoterapia¹.

Con un excelente perfil de seguridad y tolerabilidad⁴, estas combinaciones contienen candesartán cilexetilo, cuya gran protección orgánica ha sido extensamente avalada por los múltiples estudios realizados en pacientes con insuficiencia cardíaca, daño renal, ictus, etc...⁶

Parapres Plus 32® y Parapres Plus Forte® deben administrarse una única vez al día¹, hecho que se traduce en un mayor cumplimiento del tratamiento por parte del paciente⁷.



Almirall

Almirall, una compañía farmacéutica internacional basada en la innovación y comprometida con la salud, cuya sede central está ubicada en Barcelona (España), investiga, desarrolla, produce y comercializa fármacos de I+D propia y de licencia con el propósito de mejorar la salud y el bienestar de las personas.

Las áreas terapéuticas en las que concentra sus recursos de investigación están relacionadas con el tratamiento de asma, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), artritis reumatoide, esclerosis múltiple, psoriasis y otras alteraciones dermatológicas.

Actualmente, los fármacos de Almirall están presentes en más de 70 países, con presencia directa en Europa y América Latina a través de 11 filiales. Para más información, visite el web: www.almirall.com

Para más información:

Ketchum/SEIS

Sonia San Segundo/Patricia Mansilla

sonia.sansegundo@ketchum.com

Tel.: + 34 91 788 32 00

Bibliografía

¹ Ficha técnica Parapres Plus 32 y Parapres Plus Forte

² Banegas JR. Epidemiología de la hipertensión arterial en España. Situación actual y perspectivas. Hipertensión. 2005;22:353-62

³ 2007 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. Guidelines Committee. J Hypertension 2007;25:1105-1187

⁴ Bönner G et al. Antihypertensive efficacy and tolerability of candesartan-hydrochlorothiazide 32/12.5 mg and 32/25 mg Blood pressure. 2008;17(Suppl 2): 22-30

⁵ Llisterri et al. Control de la presión arterial en la población hipertensa española atendida en atención primaria. Estudio PRESCAP 2006. Med Clin (Barc). 2008;130(18):681-7

⁶ Meredith PA. Candesartan cilexetil – a review of effects on cardiovascular complications in hypertension and chronic heart failure Curr Med Res Opin 2007; 23(7): 1693-1705

⁷ Wetzels GE et al. Facts and fiction of poor compliance as a cause of inadequate blood pressure control: A systematic review. J Hipertens 2004;22(10):1849-55